

Nokalt[®]

USO VETERINÁRIO

Carrapaticida para bovinos

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Amitraz 12,50 g

Veículo q.s.p 100,00 mL

Indicações:

Para o controle do carrapato dos bovinos (*Boophilus microplus*).

Modo de uso e dosagem:

Produto para ser usado em pulverização, obedecendo a seguinte tabela:

Nokalt	Diluição
40 mL	20 litros de água
200 mL	100 litros de água
500 mL	250 litros de água
1000 mL	500 litros de água

Para bovinos: pulverizar em sentido contrário aos pelos e cobrindo todo o corpo do animal, usando 5 litros de calda por bovino adulto.

As práticas de manejo existentes em cada propriedade como a rotação de pastagens, instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência de ectoparasitas e, conseqüentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo médico-veterinário.

Contraindicações:

Não aplicar em pele lesionada.

Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos

componentes da fórmula do produto. Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

Precauções em animais:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Evitar aplicar o produto em horas de calor intenso ou em dias chuvosos, pois essas condições não foram avaliadas.

Não misturar a outros produtos.

Precauções em humanos:

Cuidado! Irritante para os olhos, pele e mucosa. Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

Perigo! Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Em caso de inalação ou aspiração acidental, procure um local arejado, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

Durante a utilização do produto, proteger-se com roupas, luvas de borracha (luva nitrílica) e máscara adequados. Não manusear o produto com as mãos desprotegidas.

Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos.

Não utilizar equipamento com vazamento. Não desentupir bicos,

orifícios e válvulas com a boca.
Não aplicar o produto contra o vento.
Não aplicar próximo a chamas.
Não aplicar sobre pessoas, alimentos e/ou culturas agrícolas. Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.
Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo, antes de comer e de beber, e após o trabalho com o produto.
Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não misturar a outros produtos.
Limpar os equipamentos ou recipientes usados de forma segura. Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto. Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.
Produto tóxico para peixes.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 15 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 05 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer, como sinais de sonolência, vômitos e diarreia.

Informações para uso médico:

Grupo químico: Amidina;
Ingrediente ativo: Amitraz;
Ação Tóxica: Inibição da enzima monoaminoxidase;
Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico. Efetuar tratamento sintomático.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000005-1.000058 em 12/01/94.

Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina
Pistoni CRMV/SP 24.508



Leia o QR code e acesse nosso Áudio Bula.



Proprietário e Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria Brasileira



5000603/0723 OF00

 **Ouro SAC**
16 3518 2025
Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)

