

# Cypermil® Pour On

Uso Veterinário

Combate a *Haematobia irritans* (Mosca-dos-chifres)

Produto pronto para uso

Para aplicação dorsal em bovinos

## Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cipermetrina ..... 5,00 g

Veículo q.s.p. .... 100,00 mL

## Indicações:

**Cypermil Pour On** é indicado para o controle estratégico exclusivamente da mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) em bovinos.

## Modo de uso e dosagens:

A aplicação do produto deve ser feita individualmente, com o animal contido por corda, canzil, brete de tábuas estreitas ou cordoalha, devendo ser administrado pela via tópica (pour on), com aplicação em toda a linha dorsal dos bovinos, da inserção da cauda até o meio do pescoço.



A dosagem recomendada do produto é de 1 mL para cada 10 kg de peso corporal, o que corresponde a 5 mg do princípio ativo Cipermetrina por kg de peso corporal, conforme tabela abaixo:

Peso (kg)	Volume de Cypermil Pour On (mL)
100	10
200	20
300	30
400	40
500	50
600	50
700	50

Para volumes menores do que 10 mL, recomenda-se dosar o produto com o

auxílio de uma seringa estéril, seguindo atentamente as dosagens indicadas nesta bula.

Para animais acima de 500 kg de peso vivo, a dose máxima recomendada é de 50 mL. Geralmente o tratamento em dose única é suficiente para diminuir a infestação, porém as práticas de manejo existentes em cada propriedade como a rotação de pastagens, instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência de parasitas e, consequentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo médico-veterinário.

## ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

### BOVINOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 24 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO 78 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

### Contraindicações:

Não utilizar em animais estressados, doentes ou convalescentes.

Não administrar em pele lesionada.

Não aplicar em animais com

hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula do produto. Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

#### **Precauções em animais:**

Evitar aplicar o produto em horas de calor intenso ou em dias chuvosos, pois essas condições não foram avaliadas. Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto. Não foram realizados estudos de segurança com animais prenhes.

#### **Precauções em humanos:**

**Cuidado!** Irritante para os olhos, pele e mucosa. Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

**Perigo!** Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto. Durante a utilização do produto, proteger-se com roupas, luvas de borracha (luva nitrílica) e máscara adequados. Não manusear o produto com as mãos desprotegidas.

Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos. Não aplicar sobre pessoas, e alimentos e/ou culturas agrícolas. Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo antes de comer e de beber e após o trabalho com o produto. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não ingerir. Não misturar a outros produtos. Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto. Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Produto tóxico para peixes. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.

#### **Reações Adversas:**

Não são esperadas reações adversas com o

uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

#### **Informações para uso médico:**

**Grupo químico:** Piretroide Sintético;

**Ingrediente ativo:** Cipermetrina;

**Ação Tóxica:** Hipersensibilizante, irritante das mucosas;

**Antídoto/Tratamento:** Anti-histaminicos e efetuar tratamento sintomático.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após aberto, consumir o produto em até 06 meses, mantendo-o em condições adequadas de armazenamento, conforme orientação de bula.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

#### **Responsável Técnica:**

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.50

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 3.665 em 11/04/1991.

#### **Importado e distribuído por: Moçambique:**

Reg.: DSV-862 – Tecap – Maputo,  
Moçambique – Tel.: (258) 2146-2916

**CUIDADO**  **VENENO**

**Proprietário e fabricante:**  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 28  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.ourofino.saudeanimal.com  
Indústria brasileira



 Atendimento  
16 3518 2025

 Whats SAC  
16 98181 8687  
(seg. a sex. das 8h às 17h)



 **ourofino**  
saúde animal